

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН



В отличие от многих других инфекций туберкулез имеет хроническое течение, что повышает число заразившихся многократно. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления может пройти от нескольких недель до нескольких лет.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА



БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ОБЩАЯ СЛАБОСТЬ;



СНИЖЕНИЕ ВЕСА И/ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА;



ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ОСОБЕННО ПОД УТРО;



ОДЫШКА ПРИ НЕБОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ;



НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА;



КАШЕЛЬ ИЛИ ПОКАШЛИВАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ, ВОЗМОЖНО С КРОВЬЮ;



ЛИХОРАДОЧНЫЙ БЛЕСК В ГЛАЗАХ.

ИСТОЧНИК – больной человек, который иногда даже не знает о своей болезни, т.к. туберкулез может протекать как

обычная простуда, длительно не выходящая пневмония, а иногда бессимптомно, поэтому при туберкулезе **ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ.**

Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма: переутомление, стрессы, неполноценное питание. А также хронические болезни легких, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, длительное курение и злоупотребление алкоголем.



ВХОДНЫЕ ВОРОТА

Чаще всего дыхательные пути, куда бациллы в огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, которые выбрасываются больными при чихании, разговоре, кашле. Заражение наступает и при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом животных.

У взрослых туберкулез можно выявить с помощью флюорографического метода, исследования мокроты, мочи на микробактерии, а также путем исследования крови.

У детей туберкулез можно выявить при помощи ежегодной пробы МАНТУ.

К методам профилактики относят в первую очередь противотуберкулезные прививки БЦЖ

Необходимо помнить, что ранним методом диагностики болезни у ребенка является постановка пробы Манту (введение в кожу туберкулина, безвредного для человека). Ежегодно ребенок должен проверяться с помощью флюорографии, также с целью раннего выявления туберкулеза. Родители должны оберегать детей от общения с неизвестными лицами, которые могут быть заражены туберкулезом.



УКЛОНЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ОТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЕЗ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫЯВЛЕНИЮ
У НИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УЖЕ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
КОТОРЫЕ ЛЕЧАТСЯ ГОДАМИ И
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДАЖЕ
СМЕРТЬЮ БОЛЬНОГО, ТОГДА, КАК
СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЕННЫЙ
ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ.

